

K-ALMILAC

REEMPLAZADOR DE LECHE PARA TERNEROS

MEDICADO

PESO NETO : 18 Kg

Lic. RCA - MAG : 447-001

Reemplazador de leche para terneros

Ayuda para la prevención de la enteritis bacterial

INGREDIENTE ACTIVO

Oxytetraciclina	125	mg/kg
Neomicina base de sulfato de neomicina	250	mg/kg

ANALISIS GARANTIZADO

HUMEDAD	(MAXIMO)	5.00%	
PROTEINA CRUDA	(MINIMO)	20.00%	
GRASA CRUDA	(MINIMO)	15.00%	
FIBRA CRUDA	(MAXIMO)	0.15%	
ENERGIA DIGESTIBLE	(MINIMO)	4500	Kcal/Kg
CALCIO	(MAXIMO)	1.00%	
CALCIO	(MINIMO)	0.70%	
FOSFORO	(MINIMO)	0.80%	
VITAMINA A	(MINIMO)	77000	UI/Kg
VITAMINA D 3	(MINIMO)	16500	UI/Kg
VITAMINA E	(MINIMO)	110	UI/KG

INGREDIENTES

Productos de suero deshidratado, proteína de leche deshidratada, leche descremada en polvo, grasa vegetal preservada con BHA, lecitina, fosfato dicálcico, acetato de vitamina A, estero animal activado (fuente de vitamina D3), suplemento de vitamina E, bisulfito de dimetilpirimidinol menadiona (fuente de actividad de Vitamina K), suplemento de Riboflavina, pantotenato de calcio, suplemento de niacina, mononitrato de tiamina, hidrocloreuro de piridoxina, cloruro de colina, suplemento de vitamina B12, biotina, acido fólico, acido ascorbico, sulfato de magnesio, sulfato de manganeso, sulfato de hierro, sulfato de zinc, sulfato de cobalto, sulfato de cobre, iodato de calcio, selenito de sodio, aluminio silicato de sodio, sabores naturales y artificiales, neomicina base, oxitetraciclina.

INSTRUCCIONES DE USO

Este sustituto de leche ha sido elaborado con ingredientes de calidad y formulado especialmente para la primera etapa de vida de los terneros.

Prepare un litro de sustituto de leche, mezclando 900 ml de agua tibia con 100 gramos de reemplazador (una copa). Esto equivale a nueve partes de agua por una de reemplazador o 2Kg de reemplazador en 18.9 litros (balde de 5 galones).

Para mejores resultados provea a los terneros un iniciador (como el Crapid) cuando alcance una semana de edad, dejándolos comer lo que quieran hasta 2 kg por día.

ALIMENTACION DOS VECES AL DIA

Edad del ternero	Razas grandes	Razas pequeñas
4-10 Dias	1.6	1.4
más de 10 Dias	2.0	1.8

ALIMENTACION UNA VEZ AL DIA

Edad del ternero	Razas grandes	Razas Pequeñas
4-10 días	2.4	2.0
más de 10 Dias	3.3	2.8

Precauciones y advertencias

Los terneros variarán en sus requerimientos de alimentación dependiendo de su edad y tamaño. Cualquier duda consulte con su Médico veterinario.

Retirar el producto 30 dias antes del sacrificio.

No utilizar este producto en terneros que van a ser procesados para carne blanca.

IDENTIFICACION

Producido por:

SCHILS B.V.

Apartado Postal 435, 6130 AK Sittard – Holanda

Tel : (31)-46-4599900

Fax : (31)-46-4599999

Distribuido por : NATIVET S.A.

125 mts norte del Liceo Samuel Sáenz

Cubujuqui, Heredia

Tel : 261 6363 – 261 6868

e-mail : nativet@racsa.co.cr

Fecha de Elaboración: 12 meses antes de la fecha indicada en la bolsa a continuación del texto "EXP.DATE".

Fecha de Expiración: usar preferiblemente antes de la fecha indicada en la bolsa a continuación del texto "EXP.DATE".

Lote: indicada en la bolsa