

PESO NETO : 20 y 25 Kg  
Lic. RCA - MAG : 447-002

# NATIMILK

REEMPLAZADOR DE LECHE PARA TERNERAS  
MEDICADO

## INGREDIENTE ACTIVO

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| Oxytetraciclina | 125 | mg/kg |
| Neomicina base  | 250 | mg/kg |

Para la prevención de la diarrea bacterial.

## ANALISIS GARANTIZADO

|                |          |        |        |
|----------------|----------|--------|--------|
| HUMEDAD        | (MAXIMO) | 5.00%  |        |
| PROTEINA CRUDA | (MINIMO) | 22.00% |        |
| GRASA CRUDA    | (MINIMO) | 16.00% |        |
| FIBRA CRUDA    | (MAXIMO) | 0.5%   |        |
| LACTOSA        | (MINIMO) | 35%    |        |
| CALCIO         | (MAXIMO) | 1.00 % |        |
| CALCIO         | (MINIMO) | 0.70 % |        |
| FOSFORO        | (MINIMO) | 0.80 % |        |
| CENIZA         | (MAXIMO) | 9.5 %  |        |
| VITAMINA A     | (MINIMO) | 40000  | UI/kg  |
| VITAMINA D 3   | (MINIMO) | 6000   | UI/kg  |
| VITAMINA E     | (MINIMO) | 50     | UI/kg  |
| VITAMINA B1    | (MINIMO) | 3.9    | mg/kg  |
| VITAMINA B2    | (MINIMO) | 5.0    | mg/kg  |
| VITAMINA B6    | (MINIMO) | 2.5    | mg/kg  |
| VITAMINA B12   | (MINIMO) | 20.0   | mcg/kg |
| VITAMINA C     | (MINIMO) | 60     | mg/kg  |
| VITAMINA K3    | (MINIMO) | 3.0    | mg/kg  |
| NIACINA        | (MINIMO) | 50     | mg/kg  |
| ZINC           | (MINIMO) | 70     | mg/kg  |

## INGREDIENTES

Productos de suero deshidratado, proteína de leche deshidratada, leche descremada en polvo, proteína de soya concentrada, proteína de trigo aislada, almidón, lecitina, fosfato dicálcico, acetato de vitamina A, estero animal activado (fuente de vitamina D3), suplemento de vitamina E, bisulfito de dimetilpirimidinol menadiona (fuente de actividad de Vitamina K), suplemento de Riboflavina, pantotenato de calcio, suplemento de niacina, mononitrato de tiamina, hidrocloreuro de piridoxina, cloruro de colina, suplemento de vitamina B12, biotina, ácido fólico, ácido ascorbico, sulfato de magnesio, sulfato de manganeso, sulfato de hierro, sulfato de zinc, sulfato de cobalto, sulfato de cobre, iodato de calcio, selenito de sodio, aluminio silicato de sodio, sabores naturales y artificiales, neomicina base, oxitetraciclina.

#### **INSTRUCCIONES DE USO**

Este sustituto de leche ha sido formulado para la primera etapa de vida de la ternera. Prepare un litro de sustituto de leche, mezclando 900 ml de agua tibia con 100 gramos de reemplazador (una copa). Esto equivale a nueve partes de agua por una de reemplazador o 2Kg de reemplazador en 18.9 litros (balde de 5 galones). Para mejores resultados provea a los terneros un iniciador (como el Crapid) cuando alcance una semana de edad, dejándolos comer lo que quieran hasta 2 kg por día.

#### **ALIMENTACION DOS VECES AL DIA**

| Edad del ternero | Razas grandes | Razas pequeñas |
|------------------|---------------|----------------|
| 4-10 Dias        | 1.6 litros    | 1.4 litros     |
| más de 10 Dias   | 2.0 litros    | 1.8 litros     |

#### **ALIMENTACION UNA VEZ AL DIA**

| Edad del ternero | Razas grandes | Razas Pequeñas |
|------------------|---------------|----------------|
| 4-10 días        | 2.4 litros    | 2.0 litros     |
| más de 10 Dias   | 3.3 litros    | 2.8 litros     |

#### **Precauciones y advertencias**

Los terneros variarán en sus requerimientos de alimentación dependiendo de su edad y tamaño. Cualquier duda consulte con su Ingeniero Agrónomo Zootecnista.

Retirar el producto 30 días antes del sacrificio. No suministrar a terneros que van a ser sacrificados para carne blanca.

Producido por: SCHILS B.V..  
Apartado postal 435, 6130 AK SITTARD-HOLANDA.  
Tel: (31)46-4599900. Fax: (31)46-45 999 99

Importado y distribuido por: NATIVET, S.A., TEL: 261 6363  
125 metros al norte del Liceo  
Samuel Sáenz.  
Cubujuquí, Heredia, Costa Rica.

Fecha de Elaboración:  
Fecha de Expiración:  
Lote: